



## COSA FARE PRIMA DELLA BIOPSIA

### Al momento della prenotazione

- Comunicare l'uso di anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici. Programmare l'eventuale sospensione con il medico curante con lo specialista di riferimento; qualora si decida di sostituire il farmaco anticoagulante con **eparina**, quest'ultima dovrebbe essere sospesa le 24 ore che precedono l'esame
- Comunicare eventuali allergie o pregressi eventi avversi all'uso di farmaci (specie se agli anestetici locali o ad antibiotici)

### Prima della biopsia

- Eseguire copertura antibiotica con Fosfomicina (Monuril) bustine 3g, salvo allergie specifiche (in tal caso consultare il proprio medico): 1 bustina la mattina del giorno della biopsia
- Eseguire un clistere di pulizia (fleet) 2-3 ore prima
- Astenersi dall'urinare da almeno 1 ora
- Digiuno da almeno 6 ore

**Portare tutta la documentazione medica concernente il caso (RM, PSA, ecografie etc.)**

## COSA FARE DOPO LA BIOPSIA

- La dimissione dall'ambulatorio avviene dopo l'esecuzione di minzione volontaria
- Togliere la medicazione due ore dopo
- Astenersi da attività lavorative e sportive che comportino:
  - il sollevamento di pesi
  - andare in bicicletta o motorino
  - attività sessuale nei 4 giorni successivi alla biopsia
- Per l'impiego di un anestetico, anche se somministrato localmente, necessita la presenza di un accompagnatore (controindicata la guida di veicoli nelle ore immediatamente successive alla biopsia)
- Proseguire la copertura antibiotica con Fosfomicina (Monuril) bustine 3g, 1 bustina la mattina dopo la procedura o con il farmaco indicato dal curante in caso di allergie specifiche.
- In caso di comparsa di complicazioni o altri problemi correlati all'esecuzione della biopsia, anche se non riportati nella scheda di informazione, chiamare la Radiologia e parlare con un medico (tel. 055 7946829) oppure il proprio urologo di fiducia