



La Entero-TC consiste in un'indagine TC dell'addome con acquisizioni in posizione supina e/o prona dopo aver ingerito una sufficiente quantità di fluidi che permetta un'adeguata distensione delle anse dell'intestino tenue per evidenziare alterazioni quali ad esempio lesioni parietali solide o polipoidi, stati infiammatori, etc

L'esame prevede inoltre l'iniezione endovenosa di mdc iodato.

**ESAMI PRELIMINARI:** CREATININEMIA (con eventuale e-GFR)

**PRECAUZIONI:** NEI PAZIENTI CHE ASSUMONO ANTI-DIABETICI ORALI O INTERLEUCINE PUO' ESSERE NECESSARIO SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE LA TERAPIA PREVIO ACCORDO CON IL MEDICO CURANTE.

IN PARTICOLARE I PAZIENTI IN TERAPIA CON METFORMINA DEVONO SOSPENDERE L'ASSUNZIONE DEL FARMACO 48 ORE PRIMA DELL'ESAME E RIPRENDERLA 48 ORE DOPO L'ESECUZIONE DELL'ESAME.

**PREPARAZIONE ALL'ESAME:**

**NEI DUE GIORNI PRIECEDENTI L'ESAME:**

- ASSUMERE UNA DIETA POVERA DI SCORIE (vedi tabella allegata dei cibi consentiti)

**IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:**

- **CENA:** DIETA LIQUIDA (brodo vegetale, latte scremato, bevande decaffeinatate o con ridotta quantità di caffeina, succhi di frutta senza polpa).
- **DALLE ORE 24:** DIGIUNO ASSOLUTO PER I CIBI SOLIDI, E' PERMESSO BERE ACQUA NON GASSATA.

**IL GIORNO DELL'ESAME:**

- DIGIUNO (se l'esame è programmato per il pomeriggio il mattino del giorno dell'esame è consentito assumere una colazione liquida e bere ACQUA O THE O CAFFE CON ZUCCHERO, senza limitazione temporale)
- PRESENTARSI PRESSO LA DIAGNOSTICA RAGIOLOGICA 1 ORA PRIMA DELL'ORARIO



Prima di eseguire l'esame il paziente dovrà assumere nell'arco di circa 60 minuti 1.5-2 litri di liquidi che gli saranno forniti presso la diagnostica per ottenere un adeguato riempimento delle anse dell'intestino tenue

In relazione alle indicazioni cliniche potrà inoltre essere proposto entero-clisma con acqua tiepida immediatamente prima dell'esecuzione dell'esame TC per ottenere una migliore distensione della anse del colon e dell'ileo distale

**E' SUGGERITO PORTARE UN EVENTUALE CAMBIO DI BIANCHERIA INTIMA.**

**AVVERTENZE:**

SEGNALARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DELL'ESAME EVENTUALI TERAPIE CON ANTI-DIABETICI ORALI O INTERLEUCINE (IN PARTICOLARE METFORMINA).

MANTENERE LE TERAPIE PRECEDENTEMENTE PRESCRITTE DAL MEDICO.

PORTARE EVENTUALI PRECEDENTI ESAMI RADIOLOGICI.

N.B. I pazienti con ipersensibilità ai mezzi di contrasto o ad altri farmaci o con manifestazioni allergiche di altra natura (asma, orticaria, etc.), devono segnalarle al **momento della prenotazione** o contattando al più presto (almeno 1 settimana prima della data di esecuzione dell'esame), la struttura presso cui verrà eseguita l'indagine, al fine di **conoscere le modalità di pre-medicazione farmacologica**.

GENERI ALIMENTARI	CIBI CONSENTITI	CIBI DA EVITARE
FARINACEI	Pane di farina 00, cracker, biscotti.	Prodotti di farina integrale, prodotti da forno che contengano crusca, granturco, farina d'avena, cereali a chicchi interi. Tutta la pasta
DOLCI	Torte e biscotti semplici, ghiaccioli, yogurt naturale con pochi grassi, crema pasticcera, gelatine, gelato senza cioccolato e nocciole	Cioccolato, alimenti contenenti farina integrale, semi, cocco, yogurt con pezzi di frutta, frutta secca, nocciole, pop-corn
FRUTTA	Frutta sciroppata, banane mature, sciroppo di mele	Frutta secca, frutti di bosco, frutta non cotta, nocciole, semi



VERDURE	Patate bianche bollite senza la buccia, carote	Tutto il resto compreso verdure fritte o crude, broccoli, cavolo e cavolfiore, spinaci, piselli, mais e altre verdure con semi
CONDIMENTI	Margarina, olio, maionese leggera	Burro, strutto e qualsiasi cosa che contenga alimenti già esclusi sopra
CARNE E SUOI SOSTITUTI	Carne di pollo e tacchino, pesce, frutti di mare, uova e formaggi leggeri	Carne rossa, fagioli, piselli, legumi, burro di arachidi, formaggio fatto con latte intero
BRODI	Brodo vegetale (carote o patate) eliminando la parte solida delle verdure	Passati di verdura
BEVANDE	Latte scremato, tutte le bevande decaffeinatate, bevande contenenti caffeina in quantità molto ridotta, succhi di frutta senza polpa	Caffè espresso, cappuccino, latte intero, succhi di frutta con polpa, tutte le bevande alcoliche