

ESAMI PRELIMINARI

- Ioduria (con valori inferiori al valore di riferimento del laboratorio)

PREPARAZIONE ALL'ESAME

- Sospendere farmaci e prodotti contenenti iodio, che possono interferire con l'accumulo del tracciante, per il tempo riportato nella seguente tabella:

Farmaci antitiroidei (Tapazole)	3 settimane
Levotiroxina (Eutirox)	4 settimane
Sale iodato	3 - 4 settimane
Soluzioni di Lugol	3 - 4 settimane
Disinfettanti, espettoranti, lavande vaginali, tintura di iodio	3 - 4 settimane
Altri prodotti contenenti iodio (alghe marine, creme anti-cellulite, dentifrici, dimagranti, multivitaminici, tinture per capelli,)	3 - 4 settimane
Mezzi di contrasto radiografici idrosolubili (TC, urografia e angiografie)	4 settimane
Mezzi di contrasto radiografici liposolubili (oggi usati raramente)	3-6 mesi o più
Amiodarone (Cordarone)	3-6 mesi o più

- Sospendere, col consenso del medico curante, i farmaci che interferiscono col metabolismo degli ioduri (litio, bromo, ecc.)

AVVERTENZE

- Mantenere le altre terapie prescritte
- Portare la documentazione clinico-strumentale:
 - Dosaggio ormoni tiroidei plasmatici
 - Ecografia tiroidea
 - Precedente Test di Captazione Tiroidea e/o Scintigrafia Tiroidea
- Per il giorno dell'esame si consiglia di vestirsi con abiti comodi (ad es. tuta da ginnastica) e di non indossare gioielli (orecchini, collane, ecc.) per evitare il loro smarrimento.

CONTROINDICAZIONI

- Stato di gravidanza

TECNICA DELL'INDAGINE

- Somministrazione del tracciante per via endovenosa e misurazione del radioiodio captato a 24, 48 e 96 ore della durata di circa 20 min.

PRECAUZIONI DOPO L'ESAME

Nessuna