



**PREPARAZIONE  
SCINTIGRAFIA DELLA MIDOLLARE SURRENALE,  
SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON  
TRACCIANTE RECETTORIALE MIBG**



## ESAMI PRELIMINARI

- Nessuno

## PREPARAZIONE ALL'ESAME

- Non bisogna essere a digiuno.
- Sospendere a giudizio del medico curante la terapia con
  - beta-bloccanti da 7 giorni prima dell'esame
  - calcio-antagonisti da 7 giorni prima dell'esame
  - antidepressivi triciclici da 3 giorni prima dell'esame

I farmaci anti-ipertensivi possono essere sostituiti con altri farmaci quali doxazosina, lasix, sartanici da assumere anche la mattina dell'esame.

## AVVERTENZE

- Mantenere le altre terapie prescritte.
- Portare documentazione clinico-strumentale
  - Relazioni cliniche
  - Esami ematici e delle urine: normetanefrina e metanefrina urinaria.
  - Ecografia addome, TC o RM addome
- Per il giorno dell'esame si consiglia di vestirsi con abiti comodi (ad es. tuta da ginnastica) e di non indossare gioielli (orecchini, collane, ecc.) per evitare il loro smarrimento.

## CONTROINDICAZIONI

- Stato di gravidanza
- Gravi cardiopatie

## TECNICA DELL'INDAGINE

- Somministrazione del tracciante per via endovenosa e, a distanza di circa 24 ore, scansione tomografica e totale corporea della durata di 30 min ciascuna.

## PRECAUZIONI DOPO L'ESAME

- Non stare a contatto diretto con donne in gravidanza e bambini sotto i 10 anni per le 48 ore successive alla somministrazione del tracciante.