



ESAMI PRELIMINARI

- Nessuno

PREPARAZIONE ALL'ESAME

- Non è necessario il digiuno
- Sospendere a giudizio del medico curante la terapia con:
 - Sertralina da 7 giorni prima dell'esame
 - Bupropione da 7 giorni prima dell'esame
 - Modafinil da 7 giorni prima dell'esame
- Sospendere l'assunzione di altre sostanze interferenti quali anfetamina, benzotropina, cocaina, metilfenidato, fentermina da 7 giorni prima dell'esame.

AVVERTENZE

- Mantenere le altre terapie prescritte
- Portare documentazione clinico-strumentale
 - Relazioni neurologiche
 - RM o TC dell'encefalo
- Per il giorno dell'esame si consiglia di vestirsi con abiti comodi (ad es. tuta da ginnastica) e di non indossare gioielli (orecchini, collane, ecc.) per evitare il loro smarrimento.

CONTROINDICAZIONI

- Stato di gravidanza

TECNICA DELL'INDAGINE

- Somministrazione del tracciante per via endovenosa seguita a distanza di 3 - 3 ½ ore da scansione tomografica della durata di 40 min

PRECAUZIONI DOPO L'ESAME

- Non stare a contatto diretto con donne in gravidanza e bambini sotto i 10 anni per le 24 ore successive alla somministrazione del tracciante.