



ESAMI PRELIMINARI

- Nessuno

PREPARAZIONE ALL'ESAME

- Digiuno da 4 ore
- In caso di paziente **diabetico**, si consiglia di assumere regolarmente la terapia antidiabetica e di ridurre l'apporto di carboidrati nei giorni precedenti l'esame in modo da mantenere la glicemia inferiore a 150 mg/dl a digiuno e/o a distanza di 4 ore dall'assunzione di insulina.

AVVERTENZE

- Mantenere le terapie prescritte
- Portare documentazione clinico-strumentale
 - Relazioni cliniche
 - Esami ematici: markers tumorali
 - TC, RM, Scintigrafie e/o precedenti PET
- Per il giorno dell'esame si consiglia di vestirsi con abiti comodi (ad es. tuta da ginnastica) e di non indossare gioielli (orecchini, collane, ecc.) per evitare il loro smarrimento.

CONTROINDICAZIONI

- Stato di gravidanza

TECNICA DELL'INDAGINE

- Dosaggio della glicemia e successiva somministrazione del tracciante per via endovenosa seguita, a distanza di 60 min, da scansione PET di 20-30 min

PRECAUZIONI DOPO L'ESAME

- Non stare a contatto diretto con donne in gravidanza e bambini sotto i 10 anni per le 6 - 8 ore successive alla somministrazione del tracciante.