



L'isterosalpingografia viene effettuata nel periodo compreso tra la sesta e la dodicesima giornata del ciclo mestruale al fine di evitare di eseguire l'esame in presenza di una gravidanza misconosciuta; per questo motivo, nel periodo del ciclo che precede l'esame, la paziente deve evitare rapporti sessuali non protetti.

ESAMI PRELIMINARI

Nessuno

PREPARAZIONE ALL'ESAME

- Terapia antibiotica con azitromicina (Zitromax) 500 mg 1 cps al giorno, per 3 giorni iniziando l'assunzione il giorno prima dell'esame
- Il giorno dell'esame: digiuna
- In caso di moderata perdita ematica in atto la mattina dell'esame è necessario effettuare una lavanda vaginale (in farmacia esistono confezioni pronte all'uso); se il sanguinamento è eccessivo, è preferibile rimandare l'esame

AVVERTENZE

- Prenotare l'esame il primo giorno delle mestruazioni
- Le pazienti con **ipersensibilità** a farmaci o con **manifestazioni allergiche** di varia natura (asma, orticaria, ecc.), devono segnalarlo al momento della prenotazione per la opportuna premedicazione farmacologica
- Mantenere le terapie precedentemente prescritte dal medico
- Portare eventuali precedenti esami radiologici (ecografia pelvica, isterosalpingografia, risonanza magnetica ecc.)