

## ESAMI PRELIMINARI

- Nessuno

## PREPARAZIONE ALL'ESAME

- Non è necessario il digiuno
- Sospendere farmaci e prodotti contenenti iodio, che possono interferire con l'accumulo del tracciante, per il tempo riportato nella seguente tabella:

Farmaci antitiroidei (Tapazole)	5 - 7 giorni
Levotiroxina (Eutirox)	Minimo 15 giorni
Sale iodato	Circa 3 - 4 settimane
Soluzioni di Lugol	Circa 3 - 4 settimane
Disinfettanti, espettoranti, lavande vaginali, tintura di iodio	Circa 3 - 4 settimane
Altri prodotti contenenti iodio (alghe marine, creme anti-cellulite, dentifrici, dimagranti, multivitaminici, tinture per capelli,)	Circa 3 - 4 settimane
Mezzi di contrasto radiografici idrosolubili (TC, urografia e angiografie)	4 settimane
Mezzi di contrasto radiografici liposolubili (oggi usati raramente)	3-6 mesi o più
Amiodarone (Cordarone)	3-6 mesi o più

## AVVERTENZE

- Mantenere le altre terapie prescritte.
- Portare la documentazione clinico-strumentale:
  - Dosaggio ormoni tiroidei plasmatici
  - Ecografia tiroidea, precedente Scintigrafia Tiroidea
- Per il giorno dell'esame si consiglia di vestirsi con abiti comodi (ad es. tuta da ginnastica) e di non indossare gioielli (orecchini, collane, ecc.) per evitare il loro smarrimento.

## CONTROINDICAZIONI

- Stato di gravidanza

## TECNICA DELL'INDAGINE

- Somministrazione del tracciante per via endovenosa seguita dopo 20 min da una scansione scintigrafica della durata di 20 min.

## PRECAUZIONI DOPO L'ESAME

- Non stare a contatto diretto con donne in gravidanza e bambini sotto i 10 anni per le 24 ore successive alla somministrazione del tracciante.