



ESAMI PRELIMINARI

- Nessuno

PREPARAZIONE ALL'ESAME

- Non bisogna essere a digiuno.
- Eseguire iodoprofilassi dal giorno precedente l'esame e nei 4 giorni successivi secondo le modalità definite al momento della prenotazione.
- Se richiesto test di soppressione con Desametazone, assumere il Desametazone (2-3 mg/die) a partire dai tre giorni prima dell'esame per 6 giorni. Sospendere previo consenso del curante la terapia con anti-aldosteronici e canreonato di potassio da 15 giorni prima dell'esame.

AVVERTENZE

- Mantenere le altre terapie prescritte
- Portare documentazione clinico-strumentale
 - Ecografia addome, TC o RM addome
 - Esami ematici e delle urine: cortisolo plasmatico, ACTH, cortisolo libero urinario (CLU)
- Per il giorno dell'esame si consiglia di vestirsi con abiti comodi (ad es. tuta da ginnastica) e di non indossare gioielli (orecchini, collane, ecc.) per evitare il loro smarrimento.

CONTROINDICAZIONI

- Stato di gravidanza

TECNICA DELL'INDAGINE

- Somministrazione del tracciante per via endovenosa e, a distanza di 24 e 72 ore, scansioni tomografiche della durata di 50 min.

PRECAUZIONI DOPO L'ESAME

- Non stare a contatto diretto con donne in gravidanza e bambini sotto i 10 anni per i 4 giorni successivi alla somministrazione del tracciante.