



**PREPARAZIONE
SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE RENALE,
SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE RENALE CON
TEST FARMACOLOGICO (FUROSEMIDE),
SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE RENALE CON
TEST AL CAPTOPRIL**



ESAMI PRELIMINARI

- Nessuno

PREPARAZIONE ALL'ESAME

- Non è necessario il digiuno
- Per i pazienti adulti si consiglia di bere circa un mezzo litro d'acqua nei 30 min precedenti l'esame e di urinare al bisogno.
- Se si deve eseguire il **Test al Captopril**, sospendere a giudizio del medico curante la terapia con:
 - ACE-Inibitori da 7 giorni prima dell'esame
 - Antagonisti dell'angiotensina (sartanici) da 3 giorni prima dell'esame

che possono essere sostituiti con altri farmaci quali beta-bloccanti, calcio-antagonisti da non assumere, comunque, la mattina dell'esame.

AVVERTENZE

- Mantenere le altre terapie prescritte salvo diversa indicazione del medico richiedente.
- Portare documentazione clinico-strumentale
 - Esami ematici: creatininemia, azotemia, clearance della creatinina
 - Ecografia addome, Ecocolordoppler arterie renali, TC o RM addome
- Per il giorno dell'esame si consiglia di vestirsi con abiti comodi (ad es. tuta da ginnastica) e di non indossare gioielli (orecchini, collane, ecc.) per evitare il loro smarrimento.

CONTROINDICAZIONI

- Stato di gravidanza

TECNICA DELL'INDAGINE

- Somministrazione del tracciante per via endovenosa e contemporanea acquisizione con scansione dinamica della durata di 30 min. In caso di **Test con Furosemide**, si aggiunge una sequenza di 20 minuti preceduta dalla somministrazione di furosemide sempre per via endovenosa.
- Per il **Test al Captopril**, somministrazione di 25-50 mg di captopril seguita a distanza di 45-60 minuti dall'esame scintigrafico con scansione dinamica della durata di 30 - 45 min.

PRECAUZIONI DOPO L'ESAME

- Non stare a contatto diretto con donne in gravidanza e bambini sotto i 10 anni per le 6 - 8 ore successive alla somministrazione del tracciante.