



## ESAMI PRELIMINARI

- Nessuno

## PREPARAZIONE ALL'ESAME

- **In corso di stimolo:**
  - Diggiuno da 6 ore
  - La terapia cardioattiva va mantenuta salvo indicazioni specifiche da parte del cardiologo curante
  - Non assumere derivati fillinici (caffeina, teina. Ecc.) e antiasmatici (teofillina) da 24 ore (per i farmaci a dismissione protratta: anche da 72 ore)
- **A riposo:**
  - Non è necessario il digiuno
  - Non è necessaria sospensione farmacologica

## AVVERTENZE

- Mantenere le altre terapie prescritte
- Portare documentazione clinico-strumentale
  - Relazioni cliniche
  - ECG basale, ECO cuore, precedenti Scintigrafie
- Per il giorno dell'esame si consiglia di vestirsi con scarpe ed abiti comodi (ad es. tuta da ginnastica) e di non indossare gioielli (orecchini, collane, ecc.) per evitare il loro smarrimento.

## CONTROINDICAZIONI

- Stato di gravidanza

## TECNICA DELL'INDAGINE

- **In corso di stimolo**
  - Preparazione del paziente per registrazione dell'ECG, monitoraggio della pressione arteriosa e inserimento di agocannula in una vena del



braccio

- Esecuzione del test di stimolo (test da sforzo al cicloergometro o test farmacologico)
- Somministrazione del tracciante seguita subito da scansione PET di 15 min o, a distanza di circa 30 min, da scansione SPET di 20 min

- **A riposo**

- Somministrazione del tracciante seguita subito da scansione PET di 15 min o, a distanza di circa 45 min, da scansione SPET di 20 min

**PRECAUZIONI DOPO L'ESAME**

- Non stare a contatto diretto con donne in gravidanza e bambini sotto i 10 anni per le 24 ore successive la somministrazione del tracciante.