



ESAMI PRELIMINARI

- Nessuno

PREPARAZIONE ALL'ESAME

- **Ricerca di enterorragie**
 - Non è necessario il digiuno
- **Ricerca di mucosa gastrica ectopica (diverticolo di Meckel)**
 - Digiuno da 4 ore

AVVERTENZE

- Mantenere le terapie prescritte
- Portare documentazione clinico-strumentale
 - Relazioni cliniche
 - Esami ematici: emocromo con formula
 - EGDS, Colonscopia, Rx o TC del distretto in esame
- Per il giorno dell'esame si consiglia di vestirsi con abiti comodi (ad es. tuta da ginnastica) e di non indossare gioielli (orecchini, collane, ecc.) per evitare il loro smarrimento.

CONTROINDICAZIONI

- Stato di gravidanza

TECNICA DELL'INDAGINE

- **Ricerca di enterorragie**
 - Premedicazione per via endovenosa seguita dopo 20 min dalla somministrazione del tracciante e contemporanea scansione scintigrafica della durata di 60 min. Saranno eseguite scansioni tardive seriate fino a 4 - 5 ore ed a 24 ore dalla somministrazione del tracciante.
- **Ricerca di mucosa gastrica ectopica (diverticolo di Meckel)**
 - Somministrazione del tracciante e contemporanea scansione scintigrafica della durata di 60 min.

PRECAUZIONI DOPO L'ESAME

- Non stare a contatto diretto con donne in gravidanza e bambini sotto i 10 anni per le 24 ore successive la somministrazione del tracciante.