

## ESAMI PRELIMINARI

- Test di Captazione Tiroidea
- Ioduria (con valori inferiori al valore di riferimento del laboratorio)
- Dosaggio ormoni tiroidei plasmatici,
- Emocromo con formula e piastrine, bilirubina totale e diretta, ALT, AST

## PREPARAZIONE ALL'ESAME

- Digiuno da 3 ore
- Sospendere la terapia con Tapazole da 3 settimane
- Sospendere tutti i composti iodati (sale iodurato, tintura di iodio, ecc...) da almeno 3 settimane
- Sospendere, col consenso del medico curante, i farmaci che interferiscono col metabolismo degli ioduri (litio, bromo, ecc,,)

## AVVERTENZE

- Mantenere le altre terapie prescritte
- Portare la documentazione clinico-strumentale e di laboratorio.

## CONTROINDICAZIONI

- Stato di gravidanza

## MODALITA' DEL TRATTAMENTO

- Somministrazione della dose di radioiodio definita in base al test di captazione ed alla scintigrafia con 131-Iodio, al calcolo della irradiazione portata al tessuto tiroideo captante, alle condizioni cliniche del paziente ed alle finalità terapeutiche da raggiungere.

## PRECAUZIONI DOPO IL TRATTAMENTO

- Date le elevate dosi di radiofarmaco impiegato sono consigliate precauzioni comportamentali dopo la terapia che vengono fornite al momento della pianificazione della terapia.