

L'entero-TC è un'indagine TC dell'addome con acquisizioni in posizione supina e/o prona dopo aver ingerito una sufficiente quantità di fluidi che permetta un'adeguata distensione delle anse dell'intestino tenue al fine di evidenziare alterazioni delle pareti del piccolo intestino quali ad esempio lesioni parietali solide o polipoidi, stati infiammatori, ecc.

L'esame prevede inoltre l'iniezione endovenosa di mdc iodato.

### ESAMI PRELIMINARI

- Creatininemia (e/o e-GFR) effettuata in data non antecedente ai 3 mesi

*In caso di insufficienza renale nota o per valori alterati della creatininemia, è consigliabile ripetere il prelievo in prossimità dell'esame (7gg)*

### PREPARAZIONE ALL'ESAME

**Nei due giorni precedenti l'esame:**

- Assumere una dieta povera di scorie (vedi tabella allegata dei cibi consentiti)

**Il giorno prima dell'esame:**

- Cena: Dieta liquida (brodo vegetale, latte scremato, bevande decaffeinatate o con ridotta quantità di caffeina, succhi di frutta senza polpa)
- Dalle ore 24: Digiuno assoluto per cibi solidi; è permesso bere acqua non gasata

**Il giorno dell'esame:**

- Digiuno (se l'esame è programmato per il pomeriggio il mattino del giorno dell'esame è consentito assumere una colazione liquida e bere acqua o thè o caffè zuccherato, senza limitazione temporale)
- Presentarsi presso la Diagnostica Radiologica 1 ORA prima dell'orario

Prima di eseguire l'esame il paziente dovrà assumere nell'arco di circa 60 minuti

1,5 - 2 litri di liquidi che gli saranno forniti presso la diagnostica per ottenere un adeguato riempimento delle anse dell'intestino tenue.

In relazione alle indicazioni cliniche potrà inoltre essere proposto entero-clisma con acqua tiepida immediatamente prima dell'esecuzione dell'esame TC per ottenere una migliore distensione delle anse del colon e dell'ileo distale.

**Si suggerisce di portare biancheria intima di ricambio.**

**AVVERTENZE**

- Non sospendere le terapie in atto se non concordato con il proprio medico curante o con il medico radiologo
- Portare eventuali precedenti esami radiologici

GENERI ALIMENTARI	CIBI CONSENTITI	CIBI DA EVITARE
FARINACEI	Pane di farina 00, biscotti, cracker.	Prodotti di farina integrale, prodotti da forno che contengano crusca, granturco, farina d'avena, cereali a chicchi interi. Tutta la pasta.
DOLCI	Torte e biscotti semplici, ghiaccioli, yogurt naturale con pochi grassi, crema pasticcera, gelatine, gelato senza cioccolato e nocciole	Cioccolato, alimenti contenenti farina integrale, semi, cocco, yogurt con pezzi di frutta, frutta secca, nocciole, pop-corn.
FRUTTA	Frutta sciroppata, banane mature, sciroppo di mele.	Frutta secca, frutti di bosco, frutta non cotta, nocciole, semi.
VERDURE	Patate bianche bollite senza la buccia, carote	Tutto il resto compreso verdure fritte o crude, broccoli, cavolo e cavolfiore, spinaci, piselli, mais e altre verdure con semi.
CONDIMENTI	Margarina, olio, maionese leggera.	Burro, strutto e qualsiasi cosa che contenga alimenti già esclusi sopra
CARNE E SUOI SOSTITUTI	Carne di pollo e tacchino, pesce, frutti di mare, uova e formaggi leggeri.	Carne rossa, fagioli, piselli, legumi, burro di arachidi, formaggio fatto con latte intero
BRODI	Brodo vegetale (carote o patate) eliminando la parte solida delle verdure.	Passati di verdura
BEVANDE	Latte scremato, tutte le bevande decaffeinatate, bevande contenenti caffeina in quantità molto ridotta, succhi di frutta senza polpa	Caffè espresso, cappuccino, latte intero, succhi di frutta con polpa, tutte le bevande alcoliche