

Sospensione della donazione di sangue

A tutela dei riceventi, come previsto dalla normativa, i donatori di sangue già selezionati devono sospendere le donazioni in relazione al loro stato di salute o stile di vita.

Sospensione definitiva

Il donatore che si trova in una di queste situazioni non potrà più donare sangue o emoderivati:

- Abitudini sessuali caratterizzate da promiscuità o occasionalità
- Alcolismo cronico
- Diabete Mellito insulino-dipendente
- Encefalopatia Spongiforme, Malattia di Creutzfeldt Jakob e varianti
- Malattie autoimmuni con impegno multi organo
- Malattie cardiovascolari gravi (ammesse le anomalie congenite guarite o corrette)
- Malattie organiche del SNC ed Epilessia in terapia farmacologica
- Neoplasie maligne (ammessi solo carcinoma basocellulare e carcinoma in situ cervice uterina, entrambi dopo rimozione chirurgica)
- Patologie infettive croniche: Epatite B, Epatite C, HIV
- Trapianti di organi solidi e cellule staminali, e xenotrapianti
- Uso abituale di sostanze stupefacenti

Sospensione temporanea

Nelle situazioni sotto indicate, trascorso il periodo di non idoneità, è consentita la ripresa della donazione.

CAUSE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA	DURATA DELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA
Agopuntura	Sospensione per 4 mesi ; nessuna sospensione se il donatore autocertifica che è stata eseguita da personale competente con aghi monouso
Foratura delle orecchie, body-piercing e tatuaggi	Sospensione per 4 mesi
Assunzione di antibiotici, antimicotici, antivirali	Sospensione per 15 giorni dall'ultima somministrazione; necessaria comunque la guarigione
Assunzione di corticosteroidi sistemici	Sospensione per 15 giorni .
Assunzione di FANS (Aspirina, Aulin, Moment) altri analgesici (eccetto paracetamolo)	Sospensione per 5 giorni dall'ultima somministrazione
Assunzione di pillola anticoncezionale	Nessuna sospensione
Assunzione di psicofarmaci: antidepressivi, neurolettici, litio, stabilizzanti dell'umore	Sospensione per 6 mesi dal termine della terapia; l' uso occasionale , sporadico e a bassi dosaggi di benzodiazepine non controindica la donazione
Comportamenti sessuali a rischio	Sospensione per 4 mesi ; l'abitudine a tali tipi di rapporti costituisce criterio di esclusione definitiva
Cure odontoiatriche tipo ablazione tartaro, estrazioni e devitalizzazioni	Sospensione da 48 ore fino 7 giorni a seconda del tipo di intervento effettuato
Implantologia con utilizzo di tessuto osseo autologo e omologo	Sospensione per 4 mesi
Esame con utilizzo di mezzo di contrasto	Sospensione per 15 giorni
Esposizione accidentale al sangue anche attraverso strumenti o siringhe	Sospensione per 4 mesi
Febbre e gastroenterite virale	Sospensione per 15 giorni dalla scomparsa dei sintomi
Infezioni addominali, infezioni respiratorie e urinarie	Sospensione per 15 giorni dalla cessazione dei sintomi
Interruzione di gravidanza o espletamento parto	Sospensione per 6 mesi ; nel caso di gravidanza in atto non è possibile la donazione
Intervento chirurgico in endoscopia	Sospensione per 4 mesi
Intervento chirurgico maggiore	Di norma sospensione per 4 mesi
Intervento chirurgico minore in anestesia locale (asportazione neo, lipoma, tunnel carpale, safenectomia, ernia inguinale)	Sospensione fino a 7 giorni dopo la guarigione completa
Malattie esantematiche	Sospensione per 2/3 settimane dalla guarigione
Mestruazione	Si sconsiglia la donazione durante il ciclo
Puntura di zecca	Sospensione per 3 mesi
Raffreddore	Sospensione solo in fase acuta sino alla scomparsa dei sintomi
Terapia con immunoglobuline	Sospensione per 4 mesi
Terapia desensibilizzante	Sospensione per 72 ore dall'ultima iniezione; in caso di terapia sublinguale non necessaria la sospensione
Trapianti di tessuti o cellule di origine umana	Sospensione per 4 mesi
Trasfusioni di sangue o emoderivati	Sospensione per 4 mesi (per trasfusioni di emocomponenti effettuate nel Regno Unito, sospensione definitiva)
Uso occasionale di sostanze stupefacenti cannabinoidi	Sospensione per 14 giorni dall'ultima assunzione; l' uso abituale costituisce criterio di esclusione definitiva
Vaccini con virus, batteri, rickettsie inattivati o uccisi e vaccini ricombinanti; tossoidi, vaccino Epatite A	Sospensione per 48 ore
Vaccino epatite B	Sospensione per 7 giorni
Vaccino encefalite da zecche	Nessuna sospensione
Vaccino rabbia	Sospensione per 48 ore se vaccino senza morso Sospensione per 1 anno se vaccino dopo morso
Vaccini con virus o batteri vivi o attenuati	Sospensione per 4 settimane
Viaggi in aree tropicali	Sospensione per 6 mesi (possibile la donazione di plasma previa valutazione medica)
Viaggi in paesi al di fuori delle aree tropicali, dove sono possibili comunque malattie tropicali	Sospensione variabile da 1 a 6 mesi (consultare online "Il donatore che viaggia" https://inviaggio.simti.it)
Virus del Nilo Occidentale	Sospensione per 28 giorni
Virus erpetici genitali	Sospensione fino a 2 settimane dopo la guarigione